

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES para Mascotas con Parásitos Intestinales

La causa de la diarrea y el potencial de desarrollar disbiosis intestinal deben ser considerados al construir un plan integral de manejo parasitario.



La diarrea típicamente es el resultado del daño físico al intestino durante la infestación¹⁻³

- Parásitos del intestino delgado, como coccidias y anquilostomas, pueden causar diarrea al dañar la mucosa, impidiendo así la absorción de nutrientes.^{1,2}
- Los tricocéfalos causan colitis a través de la invasión directa a la mucosa del intestino grueso³



Abordar la disbiosis es una consideración emergente en el manejo de la parasitosis intestinal.

- Nuevos estudios documentan disbiosis intestinal primaria durante las infestaciones de nemátodos, que puede verse influenciada aún más por el uso de antihelmínticos.^{4,5}



El uso de la nutrición terapéutica de Hill's junto con medicamentos antiparasitarios puede apoyar activamente el proceso de curación del tracto gastrointestinal y ayudar a controlar la diarrea.

	Diarrea de Intestino Delgado Priorizar nutrición altamente digestible	Diarrea de Intestino Grueso Priorizar nutrición enriquecida con fibra
Paso 1: Defina la presentación clínica	• Generalmente, menor frecuencia de defecación y mayor volumen de heces.* • Más común con: nemátodos, anquilostomas, coccidia, giardia y céstodos	• Generalmente, evacuaciones con moco y sangre, menos voluminosas y más frecuentes. • Más común con: tricocéfalos
Paso 2: Haga su recomendación nutricional	• Variedades de Hill's Prescription Diet i/d Canino & Felino	• Variedades de Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Canine & Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Stress Feline **
¿Cómo ayuda?	La alta digestibilidad de nutrientes apoya la óptima absorción por el intestino delgado mientras se recupera, y minimiza los residuos de alimentos que pueden contribuir a la diarrea.	La mezcla de fibras prebióticas (ActivBiome+) promueve la producción de ácidos grasos de cadena corta y compuestos antiinflamatorios para apoyar la recuperación intestinal.

*La diarrea puede no correlacionarse con la localización de la colonización parasitaria y debe tratarse en función del juicio clínico del veterinario sobre el segmento intestinal afectado.

**Prescription Diet Gastrointestinal Biome Canino y Prescription Diet Gastrointestinal Stress Felino han sido evaluados mediante los procedimientos de ensayo de alimentación de la AAFCO para el mantenimiento de perros y gatos adultos, respectivamente. Si la alimentación a corto plazo de animales en crecimiento se considera apropiada, a criterio del veterinario, debe limitarse a 1-2 semanas consecutivas.

1. Animal Parasite Council guidelines on management of Hookworms., 12 Sept. 2022

2. Companion Animal Parasite Council guidelines on management of Coccidia, 10 Oct. 2016

3. Companion Animal Parasite Council guidelines on management of Whipworms., 12 Sept. 2022

4. Wang N, Sieng S, Chen P, Liang T, Xu J, Han Q. Regulation Effect of Toxocara canis and Anthelmintics on Intestinal Microbiota Diversity and Composition in Dog. Microorganisms. 2024; 12(10):2037.

5. Sieng S, Chen P, Wang N, Xu JY, Han Q. Toxocara canis-induced changes in host intestinal microbial communities. Parasit Vectors. 2023 Dec 19;16(1):462.

Siempre un paso adelante de los problemas gastrointestinales

Manejo Nutricional para perros con trastornos gastrointestinales

Diarrea de intestino delgado	Trastornos sensibles a la grasa agudos / crónicos	Diarrea de intestino grueso	Sensibilidad alimentaria crónica
- Gastroenteritis aguda - Malabsorción - Diarrea por estrés - Indiscreción alimentaria	- Pancreatitis - Hiperlipidemia - Enteropatía perdedora de proteínas	- Colitis (aguda / crónica) - Enteropatías fibro-responsivas - Diarrea responsiva a antibióticos - Constipación - Diarrea infecciosa	- Enteropatías responsivas al alimento - Reacciones adversas al alimento con signos GI
			
i/d	i/d Low fat	GI Biome	z/d *Próximamente con ActivBiome+

Manejo Nutricional para gatos con trastornos gastrointestinales

Diarrea de intestino delgado	Diarrea de intestino grueso	Sensibilidad alimentaria crónica
- Gastroenteritis aguda - Pancreatitis - Insuficiencia Pancreática Exócrina - Megacolon (no fibro-responsivo)	- Colitis (aguda / crónica) - Constipación - Enteropatías fibro-responsivas - Diarrea responsiva a antibióticos - Diarrea infecciosa - Megacolon fibro-responsivo	- Reacciones adversas al alimento - Enfermedad inflamatoria intestinal
		
i/d	GI Biome Stress	z/d *Próximamente con ActivBiome+